



Regional introduktion av ny medicinsk metod

Rekommendation från Norrländska läkemedelsrådet

2018-10-24

Version 1

Ninlaro®, ixazomib

Avsett för behandling av multipelt myelom

Sammanfattande ställningstagande

Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel (ARIL) rekommenderar landstingen i norra regionen att följa NT-rådets rekommendation att godkänna att Ninlaro kan användas till patienter som genomgått minst två tidigare behandlingar av multipelt myelom i enlighet med förmånsbeslut från TLV

NT-rådets rekommendation återfinns på janusinfo.se

Kostnadskonsekvensen beräknas för norra regionen på årsbasis.

Kostnaden ovan tar inte hänsyn till återbäringsavtalet som är sekretessbelagt.

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av chefsamrådet och ARIL 8-10 ggr. / år.



Generiskt namn och ATC-kod

Ixazomib L01XX50

Handelsnamn och tillverkare

Ninlaro Takeda Pharma

Godkänd indikation

I kombination med lenalidomid och dexametason är indicerat för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som tidigare har fått minst en behandling. Kravet från TLV i förmånsbeslutet är minst två tidigare behandlingar.

Nominering och anmälan

Birgitta Lauri, överläkare hematologi

Kostnader för norra regionens landsting

TLV har haft trepartsöverläggningar med landstingen och företaget. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och landstingen kommit överens om en sidoöverenskommelse om riskdelning kring behandlingens längd som parterna avser att tillföra ärendet. Genom sidoöverenskommelsen åtar sig företaget att återbära en del av landstingens kostnader för Ninlaro vilket innebär att osäkerheten gällande kostnaden för användning minskar.

Uppskattad kostnadskonsekvens för norra regionens landsting

Beräkningen nedan bygger på en uppskattad totalkostnad per cykel på för kombination Ninlaro + Revlimid + dexametason. Andelen av kostnaden för Ninlaro är per cykel á 4 veckor. Vi utgår ifrån att behandlingen upphör efter \approx 18 cykler. Priset för Ninlaro nedan är innan återbäring och för en total behandlingens längd på c:a 18 månader.

	<u>Antal pat</u>	<u>Mkr / 18 mån</u>
RJH		
RVN		
VLL		
NLL		
<hr/>		
Total		

Ersätter annan läkemedelsbehandling

Kan ersätta någon av de övriga proteasomhämmare som bortezomib och carfilzomib.

Uppföljning

Saknas i dagsläget regionalt eller nationellt protokoll. Däremot finns en nationell rekommendation.

Kontaktpersoner ARIL

Jörn Schneede, ordförande ARIL

Bilaga

Anmälan från Birgitta Lauri

REGION
JÄMTLAND
HÄRJEDALEN



Landstinget
Västernorrland



Västerbottens
läns landsting



REGION
NORRBOTTEN